


DETERIORO AGUDO DE LA CONCIENCIA

DEFINICIÓN

Es la alteración repentina y transitoria de la capacidad de percibir el entorno y responder a estímulos.


No es una enfermedad, sino una manifestación clínica de una disfunción cerebral subyacente.



CLASIFICACIÓN CUALITATIVA




CAUSAS DEL DETERIORO AGUDO DE LA CONCIENCIA



1. CAUSAS METABÓLICAS Y SISTÉMICAS



- **HIPOXIA**
(Falta de oxígeno)
- **HIPOGLUCEMIA**
(Causa reversible más crítica)
- **FALLAS ORGÁNICAS**
(Hepática, Renal)
- **DESEQUILIBRIO ELECTROLÍTICO**
(Sodio, Calcio)
- **SEPSIS / SHOCK**




2. CAUSAS NEUROLÓGICAS (ESTRUCTURALES)

- **ACV**
(Ictus isquémico / Hemorrágico)
- **TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO**
(TCE)
- **INFECCIONES DEL SNC**
(Meningitis, Encefalitis)
- **CONVULSIONES**
(Estado Post-Ictal)
- **MASA INTRACRANEAL**
(Tumor, Hemorragia)



3. CAUSAS TÓXICAS Y EXTERNAS




- **INTOXICACIÓN POR ALCOHOL**
- **OPIOIDES Y BENZODIACEPINAS**
- **DROGAS RECREATIVAS**
- **MONÓXIDO DE CARBONO (CO)**



ABORDAJE SISTEMÁTICO: EL ABCDE DE LA EMERGENCIA


A VÍA AÉREA (Airway)

- EVALUAR PERMEABILIDAD
- CONSIDERAR INTUBACIÓN (GCS < 8)
- CONTROL CERVICAL SI HUBO TRAUMA




B VENTILACIÓN (Breathing)

- ASEGURAR OXIGENACIÓN (SatO₂ > 94%)
- EVALUAR FRECUENCIA Y PATRÓN RESPIRATORIO




C CIRCULACIÓN (Circulation)

- EVALUAR PERFUSIÓN TISULAR (Llenado capilar, temperatura, color)
- CONTROLAR PULSO (Frecuencia, ritmo, fuerza)
- MONITORIZAR PULSO
- MONITORIZAR PRESIÓN ARTERIAL




D DÉFICIT NEUROLÓGICO (Disability)

- ESCALA DE GLASGOW (GCS)
- PUPILAS (TAMAÑO, SIMETRÍA, REACTIVIDAD)
- ¡CRÍTICO! GLUCEMIA CAPILAR




E EXPOSICIÓN (Exposure)


- EXAMEN FÍSICO COMPLETO (BUSCAR TRAUMA/RASH)
- CONTROL DE TEMPERATURA



MANEJO Y TRATAMIENTO INICIAL DE UNA CONVULSIÓN



1. MEDIDAS DE SOPORTE Y SEGURIDAD



ASEGURAR EL ENTORNO
(Retirar objetos peligrosos)




PROTEGER LA CABEZA
(Almohadilla suave)




NO INTRODUCIR NADA EN LA BOCA (Dedos, objetos)

NO SUJETAR AL PACIENTE
(Permitir el movimiento)



2. INTERVENCIÓN MÉDICA Y FARMACOLÓGICA



EVALUACIÓN ABCDE
(**A:** Vía aérea, **B:** Ventilación [O₂],
C: Circulación [IV])



¡CRÍTICO! GLUCEMIA CAPILAR
(Descartar hipoglucemia)



SI LA CRISIS > 2-5 MIN
(Iniciar Fármacos)

FÁRMACOS (Benzodiazepinas -
Lorazepam/Diazepam IV, IM o Rectal)